

3^{ER}

CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA FARMACIA



MADRID



ASPROFA
Asociación de Profesionales de la Farmacia

ESTUDIO DEL NÚMERO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COMO DIABÉTICOS Y TIPO DE TRATAMIENTO UTILIZADO

Sáez Fernández Eva, Risoto Baena Ana, Calles Risueño Carmen, Risoto Baena Pedro, Baena Mira Felisa

*Farmacéuticos. Farmacia Felisa Baena Mira. Linares (Jaén). E-mail: evasaez86@hotmail.com

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a un gran número de personas. En nuestro país el 13.8 % de la población adulta tiene diabetes tipo 2 según los últimos estudios de prevalencia, pero además se estima que un alto número se encuentra en estado pre-diabético y deberían ser controlados.

OBJETIVOS

Analizar el número de pacientes diagnosticados con diabetes y el tipo de medicación que tienen prescrita.


MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional llevado a cabo durante dos meses (enero-febrero de 2019) en una farmacia comunitaria de Linares (Jaén) con los pacientes que acceden a participar en el estudio facilitándonos toda la medicación que toman. De estos detectamos aquellos pacientes que están en tratamiento para la diabetes.


RESULTADOS



500 pacientes incluidos en el estudio




Solo 20 % no tratado con Biguanidas



35 % con tratamiento insulina combinada

Solo 1 % pacientes con Glucagón prescrito



PACIENTES CON TIRAS REACTIVAS

CONCLUSIONES

En nuestro entorno hay un elevado número de pacientes con diabetes.

Los fármacos más utilizados para su tratamiento son del grupo de las biguanidas por los bajos efectos adversos que presentan y los grandes beneficios. Además, un 60 % de las pacientes están siendo tratados con terapias combinadas.

No todos los pacientes que utilizan insulina tienen prescritas tiras reactivas, lo que puede suponer un peligro en el control de la glucemia.

Con respecto al glucagón, deberían de tenerlo prescrito muchos más pacientes para evitar problemas severos en una hipoglucemia.